

Apicoltura Varesina

ASSOCIAZIONE TRA I PRODUTTORI APISTICI DELLA PROVINCIA DI VARESE

IMPARARE A RICONOSCERE LA VESPA VELUTINA

Due motivi per combatterla

NEMICO DEGLI IMPOLLINATORI

Preda le api e blocca le normali attività di bottinamento, quindi porta le colonie a un lento indebolimento e alla morte.

Preda anche bombi, megachilidi, farfalle, etc


AGGRESSIVITÀ E RAPIDA DIFFUSIONE

L'aggressività verso l'uomo è analoga a quello del calabrone europeo. In prossimità dei nidi però l'attacco può essere violento: 8-12 punture possono provocare un avvelenamento che richiede il ricovero in ospedale. La sua diffusione, se non arginata, diventa incontrollabile




Quattro foto per distinguerla

Vespa crabro (calabrone comune)
In volo addome giallo visibile



Vespa velutina

In volo prevalentemente nero



Vespula vulgaris

Polistes dominula
vespa cartolaia



AZIONI CONCRETE

PREPARARE e POSIZIONARE le trappole nei propri giardini o apiari, se apicoltori.

E' possibile realizzarne una seguendo la guida presente sul sito www.stopvelutina.it, utilizzando normali bottiglie di plastica (1,5/2 L) non colorate e etichetta rimossa, con birra chiara al 4,5 / 4,7 % di alcol.

La birra chiara con quel grado alcolico risulta attrattiva per le vespe, ma non per le api.

E' possibile utilizzare gli appositi "tappi" in commercio, creati per questo scopo.

CONTROLLARE le trappole verificando la presenza di individui ed eventualmente inviare una foto a velutina@apava.net, con ubicazione. Controllare la presenza di altri insetti (api bombi farfalle etc ..), se presenti controllare bene le caratteristiche dell'esca al punto 1 o scriverci a velutina@apava.net

MONITORARE (per apicoltori) osservare il volo dei calabroni davanti agli alveari per almeno 20-30 minuti durante ogni visita, senza distrazioni. In aree a bassa densità di Vespa velutina, prolungare il tempo di osservazione per un controllo più accurato.

SEGNALARE catture di Vespa velutina e nidi, con foto, all'indirizzo velutina@apava.net o in caso di dubbi.

RICARICARE le trappole : L'esca va sostituita ogni 2 settimane.

La sorveglianza in apiario o la cattura degli individui con trappole deve essere effettuata **dal mese di febbraio a fine novembre**, considerando anche le condizioni climatiche.

PER SEGNALAZIONI IN PROVINCIA DI VARESE
SCRIVERE A VELUTINA@APAVA.NET
(VI AIUTEREMO A IDENTIFICARE LA VESPA)